

第3類医薬品 **ビタミンB₁主薬製剤**
ヒトミタンf

製品の特徴

ヒトミタンfには、1日量としてコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを900mg配合しました。

また、**ヒトミタンf**は、吸収の良いフルスルチアミンをはじめ、ビタミンB群を配合したビタミンB₁主薬製剤です。

 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚 気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を朝昼晩、水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	1 カプセル	3 回 (朝昼晩)
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。

成分・分量

3カプセル（大人の1日服用量）中

成 分	含 量
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg
フルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB ₁ 誘導体）	25mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	25mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB ₂ 酪酸エステル）	10mg
シアノコバラミン（ビタミンB ₁₂ ）	0.06mg

添加物：セルロース、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、黄色5号、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステル

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステル（ビタミンB₂酪酸エステル）によるものです。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

- (1)本製品の購入先
- (2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021
受付時間 9:00～16:30（土・日・祝日を除く）

製造販売元