

※2011年10月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

しみ、そばかす、日やけによる色素沈着

第3類医薬品 ビタミンC主薬製剤

アスピタンVC錠2000

製品の特徴

ビタミンC（アスコルビン酸）は生理的に重要な働きをするビタミンの一つですが、他のビタミンと同じように体内でつくることができないので、食品又は医薬品から積極的に摂取する必要があります。

アスピタンVC錠2000は、アスコルビン酸として2000mgを含むビタミンC主薬製剤です。



使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

3.1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

○次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。」

○次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

次の量を、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩、口の中でとかすか、又はかみくだいて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	4錠	2回(朝夕)
11歳以上15歳未満	2 1/2錠	3回(朝昼夜)
7歳以上11歳未満	2錠	
5歳以上 7歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないでください	

裏面もお読みください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

12錠中

成 分	含 量
アスコルビン酸（ビタミンC）	1000mg
L-アスコルビン酸ナトリウム (アスコルビン酸として)	1124.7mg 1000mg)
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	4mg

添加物：白糖、部分アルファー化デンプン、乳糖、サッカリンNa、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

<成分・分量に関する注意>

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。尿及び大便の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

(1)本製品の購入先

(2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室

TEL 0744-28-0021

受付時間 9:00~16:30 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9番地の2